

USE TO FLU*

是該堅持每年 接種流感疫苗 與大家一起**對** **抗心臟病的時** **候了**

*用 ♥ 來終結流感




流行性感冒通
常稱為
流感



在感染流感後前 7
天內

心臟病發作的風險

會增加 **10** 倍



所有年齡層族群
都可能感染流感

但有些族群有更高的風險會感染流感



接種疫苗可以降低流
感引起之心臟病發作
的風險高達

45%²

醫護人員的建議, 可
以提升人們接種疫苗
的意願高達
14 倍³



如老年人、具潛在健
康問題(如心臟病)的
患者、5 歲以下的兒童
以及孕婦




與無併發症的患
者比較
至少具有一種
併發症的患者
其醫療成本會直
接增加

2倍⁴

\$
£
¥
€
¥
¥

心血管疾病會對弱
勢群體造成不成比
例之負面影響。⁵

所以預防接種
更為重要。



其造成重症或引發併
發症的風險更大⁶



1. Kwong J. et al., 2018; doi: 10.1056/NEJMoa1702090 Warren-Gash C. et al., 2018; doi:10.1183/13993003.01794-2017; Ohland J. et al., 2020; doi:10.2807/1560-7917.ES.2020.25.17.1900199
2. Macintyre C. et al., 2016; doi: 10.1136/heartjnl-2016-309983 3. Lewis-Parmar H et al., 2002; PubMed PMID: 12166297 4. Karve S. et al. 2013; doi.org/10.1007/s40258-013-0020-6
5. Sperling L. et al., 2021; doi:10.1001/jamcardio.2020.3983. 6. [https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/influenza-\(seasonal\)](https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/influenza-(seasonal))