

# ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR

# #1

Causa de muerte prevenible en Argentina



# 35%

De muertes prematuras en hombres<sup>1</sup>



# 28%

De muertes prematuras en mujeres<sup>1</sup>

## EL COLESTEROL LDL



Es el principal factor de riesgo modificable causante de la ECV aterosclerótica.<sup>2</sup>

# 40%

De prevalencia de colesterol LDL elevado en la población adulta<sup>1,3</sup>

## METAS DE C-LDL



Las metas de C-LDL varían según el perfil de riesgo CV de cada paciente.<sup>4</sup>

**REDUCIR el c-LDL y LOGRAR la META en cada paciente demostró que disminuye LA MORTALIDAD CV Y la probabilidad de sufrir NUEVOS EVENTOS.<sup>2</sup>**



En prevención secundaria, solo el

# 30%

De los pacientes alcanza la meta de <70mg/dL<sup>5</sup> de la Sociedad Argentina de Cardiología y el

# 16%

alcanza la meta de <55mg dL<sup>6</sup> de la Federación Argentina de Cardiología

ECV= Enfermedad Cardiovascular c-LDL = colesterol LDL CV= cardiovascular

**Referencias:** 1. Reporte "Iniciativa argentina para la prevención del infarto agudo de miocardio" del Foro de Colesterol de la República Argentina de Diciembre 2021. 2. European Heart Journal (2017) 38, 2459–2472 doi:10.1093/eurheartj/ehx144 3. [https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/publicaciones/enfr\\_2018\\_resultados\\_definitivos.pdf](https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/publicaciones/enfr_2018_resultados_definitivos.pdf) 4. European Heart Journal (2020) 41, 111-188 doi:10.1093/eurheartj/ehz455 5. A.R. Sigal et al / Rev Fed Arg Cardiol. 2021; 50(3): 91-97 91. 5. Sociedad Argentina de Cardiología. Área de normas y consensos. Uso apropiado de las estatinas en la Argentina: Documento de posición. Rev Argent Cardiol. 2018;86 (Suplemento 1):1-13. 6. Sigal AR, Antonioli M, López Santi P, Aquino N, Lerech E, Botto F. Uso de agentes hipolipemiantes y cumplimiento de metas terapéuticas en pacientes de alto riesgo cardiovascular en la República Argentina. Rev Fed Arg Cardiol. 2021;50(3): 91-97.